

Detección de tuberculosis (TB)

Detección de tuberculosis activa:

¿Presenta signos o síntomas de tuberculosis pulmonar activa (que no sean atribuibles a otros diagnósticos médicos)?

- Tos (sobre todo si dura 3 semanas o más, con o sin producción de flema)
- Tos con sangre (hemoptisis)
- Dolor de pecho
- Pérdida del apetito
- Pérdida de peso inexplicable
- Sudoración nocturna
- Fiebre

Si se marcó alguna de las opciones anteriores, es necesario hacer una evaluación médica para excluir la TB activa.

O

- Ninguna de las opciones anteriores se aplica

Detección de TB latente:

Marque las opciones que se apliquen a su caso:

- Nació, vivió o viajó en un país con índices elevados de TB por lo menos durante un mes

La duración de por lo menos un mes consecutivo para realizar pruebas tiene la intención de identificar los viajes con más probabilidad de causar exposición a la TB.

Incluya a cualquier país distinto a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o países en Europa del norte u occidental

- Inmunodepresión, actual o planeada
- Contacto cercano con alguien que tiene TB infecciosa de por vida
- Tiene TB latente

Si marcó alguna de las opciones anteriores, es necesario hacer una prueba de TB (PPD o prueba de sangre) para descartar la TB latente.

Si ya sabe que tiene TB latente, entregue documentos de un proveedor médico donde se excluya la TB activa.

O

- Ninguna de las opciones anteriores se aplica

Firma

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FECHA DE NACIMIENTO

FIRMA

FECHA