

## 工人接觸吩坦尼的風險

工人可能因針刺、皮膚接觸、攝入、吸入或接觸眼鼻等黏膜，接觸到吩坦尼。工人更有可能因短暫接觸皮膚，接觸到吩坦尼。緊急應變人員極小機率以具臨床意義的方式接觸皮膚。

如果工人採取適當程序和通用預防措施，就不太可能經由攝入、吸入或針刺等方式接觸。

## 吩坦尼中毒的跡象包括：

- 自身定向力障礙
- 針狀瞳孔
- 呼吸窘迫、抑制或停止
- 嗜睡
- 失去意識
- 噁心/嘔吐

如果接觸到吩坦尼並出現這些症狀，請致電 (800) 222-1222 與 Washington 毒物中心通話。

## 預防

為預防吩坦尼過量，可採取以下預防措施：

- 避免所有市售藥品
- 切勿服用超過處方劑量的藥物
- 切勿混合服用藥物
- 與您的醫生討論替代的疼痛管理選項
- 備妥納洛酮，以使用於過量時的緊急治療。



## 背景

吩坦尼使用和盛行率近年來大幅增加，很多民眾都不清楚自己正在服用吩坦尼。吩坦尼的藥效力比海洛因高出 50 倍，比嗎啡高出 100 倍。

其他民眾無意間接觸吩坦尼的可能性隨著其使用和存在而提升。員工可採取一些安全措施以降低吩坦尼的接觸風險。

## 什麼是吩坦尼？

吩坦尼是與嗎啡類似的強效合成類鴉片藥物。醫生會開立用於急性疼痛治療的處方，但該藥物也被非法製造並在黑市上以娛樂性用藥的名義販售。吩坦尼與海洛因、古柯鹼和甲基安非他命等其他物質搭配使用時，危險性會因此增加。

DCYF 不會歧視，並會提供所有人相同的計畫與服務相關權利，無論其種族、性別、膚色、宗教信仰、信念、婚姻狀況、國籍、性取向、年齡、退伍軍人狀態，或是否有任何身體、感官或心理障礙。

如果您需要本文件其他格式或語言版本的副本，請撥打 DCYF Constituent Relations (DCYF 民眾關係辦公室) 電話 1-800-723-4831，或寄電子郵件至

[communications@dcyf.wa.gov](mailto:communications@dcyf.wa.gov)

DCYF PUBLICATION CWP\_0107 CHT (04-2023) Chinese Traditional

A top-down photograph of various pills and capsules in different colors (white, yellow, blue, red, green, orange) and shapes (round, oval, capsule) scattered on a light blue background.

# 吩坦尼的危險性

A top-down photograph of various pills and capsules in different colors (white, yellow, blue, red, green, orange) and shapes (round, oval, capsule) scattered on a light blue background.The logo for the Washington State Department of Children, Youth & Families, featuring a stylized family icon with a child and two adults.

Washington State Department of  
**CHILDREN, YOUTH & FAMILIES**

## 安全預防措施

- 避免在已知或疑似有呋坦尼的區域進食、飲水、吸菸或使用浴室。
- 處理可能被污染的表面後，避免觸碰您的眼睛、嘴巴或鼻子。
- 為降低接觸危險，不建議對呋坦尼或與其非常類似的藥物進行實地測試。
- 避免任何可能導致呋坦尼經由空氣傳播的測試或處理活動，並要求備有更多 PPE 與合格工作人員。
- 出現可能接觸呋坦尼的情況後，以及離開現場前，立即用肥皂和水清洗您的雙手。
- 切勿將漂白劑或手部消毒液噴在受感染的皮膚上。



## 呋坦尼過量時的症狀

呋坦尼過量的症狀包括：

- 活動過少
- 偶發哽噎
- 咕嚕聲或打鼾
- 叫不醒
- 皮膚濕冷
- 瞳孔明顯縮小
- 呼吸緩慢或無呼吸
- 運動不協調
- 嘴唇和指甲發紫
- 口齒不清或精神錯亂

如果您懷疑某人服用過量的呋坦尼或另一種類鴉片藥物，請撥打 911 或立即就醫。任何出現類鴉片藥物過量症狀的人都應該服用納洛酮。考慮到呋坦尼的藥效力有多強，有時候需要服用多劑納洛酮才能讓人恢復正常呼吸。

